

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ ПО ДАННЫМ УЗ ВГКБ СМП

Сосинович Д.Г., Михалочкин Н.Е.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».

Введение. В структуре хирургической патологии острый панкреатит занимает третье место после острого аппендицита и острого холецистита. Однако в последние годы в стационарах г.Москвы и Санкт-Петербурга панкреатит занял второе место, оттеснив острый холецистит на третье.


Летальность от острого панкреатита и по сей день остается достаточно высокой. Кроме того, данное заболевание характеризуется наличием различных клинико-морфологических форм, а подходы к тактике ведения больного и его лечения в ряде случаев неоднозначны.

Целью работы явилось изучение и анализ структуры заболеваемости острым и хроническим панкреатитом по данным УЗ ВГКБ СМП г.Витебска с 2007 по 2009 годы.

Материалы и методы. Работа выполнена на основании анализа историй болезней пациентов, находившихся на лечении в УЗ ВГКБ СМП г.Витебска по поводу панкреатита с 2007 по 2009 годы.

Результаты и обсуждение. За указанный период времени было пролечено 2127 пациентов с острым и хроническим панкреатитом. Пик заболеваемости острым панкреатитом приходится на 2008 год (402 пациента), а хроническим – на 2009 год (434 пациента).

Наблюдалось превалирование острого панкреатита над хроническим в 2007 и 2008 годах (на 14% и 21% соответственно), в 2009 году, наоборот, отмечалось преобладание хронического панкреатита над острым на 34%.




Анализируя заболеваемость панкреатитом по половому признаку, по-прежнему наблюдается лидирование «мужского» панкреатита над «женским», что можно объяснить частым нарушением режима питания и большим употреблением алкоголя мужчинами. Причем количество женщин с данной патологией продолжало оставаться приблизительно на одном уровне: 244 в 2007, 219 в 2008, 224 в 2009 году. А количество пациентов мужского пола несколько увеличилось в 2008 и 2009 годах до 504 (на 15%) и 499 (на 14%) соответственно с 437 в 2007 году.

За указанный период времени отмечалось значительное преобладание количества жителей города с диагнозом «панкреатит» над жителями села (приблизительно в 10 раз в 2007 и в 6,5 раз в 2008 и 2009 годах). По сравнению с 2007 годом, отмечалось увеличение сельских жителей на 47% в 2008 и на 44% в

2009 году. Количество жителей города продолжало оставаться приблизительно на одном уровне (616 в 2007, 627 в 2008, 629 в 2009 году).

Что касается возрастного состава, то в возрастной группе «до 20 лет» было 6 больных острым и 9 - хроническим панкреатитом. В возрастной группе «20-30 лет» количество больных увеличивается (117 острым и 153 хроническим панкреатитом). Наибольшее количество пациентов находится в возрастных категориях «30-40» и «40-50 лет» (224 с острым - 23% и 259 с хроническим панкреатитом - 22,6%). В возрасте от 50 до 60 лет наблюдается незначительное снижение до 185 (19%) острым и 216 (18,8%) хроническим панкреатитом и подъем среди пациентов старше 60 лет (223 - 22,9% и 251 - 21,9% соответственно).



Рассматривая возрастной состав всех пациентов с данной патологией, следует отметить наибольшее количество больных острым и хроническим панкреатитом в возрастной группе «старше 60 лет» в 2007 году (92 острым и 77 хроническим панкреатитом).

В 2008-2009 годах наибольшее количество пациентов острым панкреатитом находилось в возрастной группе «30 - 40 лет» (98 в 2008, 79 в 2009), а с хроническим панкреатитом среди пациентов от 40 до 50 лет (99 в 2008, 106 в 2009).


За указанный период времени количество операций, выполненных по поводу острого панкреатита, значительно превышает количество операций, выполненных по поводу хронического (в 4,5 раза в 2007 году, в 2,3 раза в 2008 году и в 2,6 раза в 2009 году).



Летальность после операций по поводу хронического панкреатита в 2007 и 2008 годах значительно превышала послеоперационную летальность в сравнении с острым панкреатитом (53,85% хроническим и 9,38% острым панкреатитом в 2007 году, 37,5% и 9,52% соответственно в 2008 году). Послеоперационная летальность в 2009 году, наоборот, была выше среди больных острым

панкреатитом (15,36% острым и 5,56% хроническим панкреатитом). В целом же летальность среди оперированных по поводу хронического панкреатита резко снизилась (почти в 10 раз), а среди оперированных больных острым панкреатитом несколько возросла (с 9,38% в 2007 году до 15,36% в 2009 году).

Общая летальность (количество всех умерших по отношению ко всем пролеченным) была приблизительно в 2 раза выше среди больных хроническим панкреатитом в 2007 году - 2,86%. Летальность при остром панкреатите составила 1,37%.



Средняя длительность лечения при остром панкреатите несколько уменьшилась (с 15,3 дней в 2007 году до 13,3 дней в 2009 году), а среди больных хроническим панкреатитом увеличилась (с 6,3 в 2007 году до 9 дней в 2009 году).

Выводы. За период с 2007 по 2009 годы возросло количество пациентов с хроническими панкреатитами и уменьшилось количество пациентов с острыми панкреатитами. Мужчины болеют почти в 2 раза чаще, чем женщины.

Больше всего панкреатитом болеют люди в возрастной группе 40-50 лет.

Средняя длительность госпитализации по поводу хронического панкреатита уменьшилась, а по поводу острого – увеличилась. Послеоперационная летальность среди оперированных по поводу хронического панкреатита резко снизилась, а среди оперированных по поводу острого панкреатита возросла. В целом летальность среди оперированных и не оперированных пациентов с 2007 по 2009 годы снизилась.

Литература:

1. Wilson JS, Int J Pancreatol/ JS Wilson, MA Korsten, RC Piroba// 1989; 4 (2) 109–25
2. Скуя Н.А. Заболевания поджелудочной железы// М.: Медицина, 1986; 240 с
3. Singh M. Int J Pancreatol// 1991; 8 (2): 111–8
4. Dominguez-Munoz JE, Am J Gastroenterol/ JE Dominguez-Munoz C Hieronymus, T Sanerbruch// 1995; 90 (10): 1834–7.
5. Логинов А.С., Рос. гастроэнтерол. журн./ А.С. Логинов, О.В. Астафьева, Л.В. Винокурова// 1995; 1: 31–3.